






ТЕСТ «РИСОВАНИЕ ЧАСОВ»





Оценка (1 = нет ошибок, 6 = часы не нарисованы)

Имя:

Дата:



Оценка	Описание	Пример
1	«Идеально»: • числа от 1 до 12 расставлены правильно; • часы имеют две стрелки и показывают правильное время (11:10).	
2	Небольшие видимые пространственные ошибки: • интервалы между числами неравные; • числа нарисованы вне круга; • поворачивал лист во время рисования таким образом, что некоторые числа оказались перевернутыми вверх ногами; • нарисованы линии для ориентации («спицы»).	

3	Ошибка в обозначении времени (рисунок часов визуально и пространственно выглядит нормально): - пропущена одна стрелка; - написано словами «10 минут 12-го»; - время не отмечено.	
4	Визуальная пространственная дезорганизация средней степени, в связи с чем невозможно правильно отобразить время: - нарушение расположения средней степени; - пропущены числа; - персеверация: повторно рисует круг, продолжает ставить цифры после 12 (13, 14, 15 и т. д.); - расположение против часовой стрелки; - дизграфия: нечитаемо.	
5	Выраженная видимая пространственная дезорганизация: как описано в п. 4, только нарушения более выражены.	
6	Часы не нарисованы (кроме депрессии и психотического состояния): - невозможно сделать рациональную попытку нарисовать часы; - нет сходства с часами; - пациент пишет слова или названия.	

Суть теста заключается в отображении пациентом циферблата часов с указанием конкретного времени на нем (например, без десяти одиннадцать). Пациент должен самостоятельно отобразить сам циферблат, отобразить на нем цифры, указать время стрелками на нужных позициях.

Ценность теста заключается также в возможности дифференциальной диагностики различных типов деменции. Для дифференциальной диагностики данных состояний при неправильном самостоятельном рисунке больного просят дорисовать стрелки на уже нарисованном (врачом) циферблате с числами. При деменциях лобного типа и деменциях с преимущественным поражением подкорковых структур легкой и умеренной степени выраженности страдает лишь самостоятельное рисование, в то время как способность расположения стрелок на уже нарисованном циферблате сохраняется. При деменции альцгеймеровского типа нарушается как самостоятельное рисование, так и способность расположения стрелок на уже готовом циферблате.