



## Батарея тестов для оценки лобной дисфункции

*The Frontal Assessment Battery (FAB)<sup>1</sup>*

**Назначение:** определение выраженности когнитивных нарушений, связанных с нарушением функции передних отделов головного мозга и лобно-подкорковых связей

**Пояснения:** Результат теста не является медицинским диагнозом.

Функции	Баллы	Комментарии
1. Концептуализация	0-3	<p>Пациента спрашивают: «Что общего между яблоком и грушей?» Правильным считают ответ, который содержит категориальное обобщение («Это фрукты»). Если больной затрудняется или дает иной ответ, ему говорят правильный ответ.</p> <p>Потом спрашивают: «Что общего между пальто и курткой?», «Что общего между столом и стулом?»</p> <p>Каждое категориальное обобщение оценивается в 1 балл.</p>
2. Беглость речи	0-3	<p>Пациента просят закрыть глаза и в течение минуты называть слова на букву С. При этом имена собственные не засчитываются.</p> <p>Результат: более 9 слов за минуту - 3 балла, от 7 до 9 - 2 балла, от 4 до 6 - 1 балл, менее 4 - 0 баллов.</p>

<p>3. Динамический праксис</p>	<p>0-3</p>	<p>Больному предлагается повторить за врачом одной рукой серию из трех движений:</p> <p>кулак (ставится горизонтально, параллельно поверхности стола) ребро (кисть ставится вертикально на медиальный край) ладонь (кисть ставится горизонтально, ладонью вниз).</p> <p>При первом предъявлении серии больной только следит за врачом, при втором предъявлении – повторяет движения врача, наконец, последующие две серии делает самостоятельно. При самостоятельном выполнении подсказки больному недопустимы.</p> <p>Результат: правильное выполнение трех серий — 3 балла, двух серий – 2 балла, одной серии (совместно с врачом) – 1 балл</p>
<p>4. Простая реакция выбора</p>	<p>0-3</p>	<p>Пациенту дается инструкция: «Сейчас я проверю Ваше внимание. Мы будем выстукивать ритм. Если я ударю один раз, Вы должны ударить два раза подряд. Если я ударю два раза подряд, Вы должны ударить только один раз».</p> <p>Выстукивается ритм: 1–1–2–1–2–2–2–1–1–2.</p> <p>Оценка результата: правильное - 3 балла, не более 2 ошибок - 2 балла, много ошибок - 1 балл, полное копирование ритма врача – 0 баллов.</p>
<p>5. Усложненная реакция выбора</p>	<p>0-3</p>	<p>Дается инструкция: «Теперь если я ударю один раз, то Вы ничего не должны делать. Если я ударю два раза подряд, Вы должны ударить только один раз».</p> <p>Выстукивается ритм: 1–1–2–1–2–2–2–1–1–2. Оценка результата аналогично п. 4.</p>

<p>6. Исследование хватательных рефлексов</p>	<p>0-3</p>	<p>Больной сидит, его просят положить руки на колени ладонями вверх и проверяют хватательный рефлекс.</p> <p>Отсутствие хватательного рефлекса оценивается в 3 балла. Если больной спрашивает, должен ли он схватить, ставится оценка 2.</p> <p>Если больной хватает, ему дается инструкция не делать этого, и хватательный рефлекс проверяется повторно.</p> <p>Если при повторном исследовании рефлекс отсутствует, ставится 1, в противном случае – 0 баллов.</p>
-----------------------------------------------	------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### **Интерпретация результатов:**

Максимальный балл - 18.

16-18 баллов соответствуют нормальной лобной функции;

12-15 баллов - умеренная лобная дисфункция;

11 баллов и меньше - признаки деменции.

1. Dubois B., Slachevsky A., Litvan I., Pillon B. The FAB: a frontal assesement battery at bedside. *Neurology*. 2000; 55: с. 1621 - 1626.

Результат теста не является медицинским диагнозом.

Информация для специалистов здравоохранения